



continental semences S.p.A.

Trifolium incarnatum *Crimson clover* Trifoglio incarnato

# Inta

**Il meglio per il pascolo** *The best for grazing*

✓ **Produzione abbondante e nutrizionalmente ben bilanciata**  
*High and nutritionally balanced production*

✓ **Particolarmente indicato per la consociazione con loietto**

*Very suitable for association with ryegrass*

✓ **Varietà tardiva che consente il pascolo più a lungo**  
*Late variety which allows longer grazing period*



# Inta

## Punti Forti *Relevant Features*



Varietà precoce / *Early variety*

**Inta** è una varietà di Trifoglio incarnato tardiva. Questo permette di poterlo pascolare fino a primavera inoltrata.

**Inta è molto adatto alla rotazione. Consente infatti di aumentare abbondantemente il contenuto di sostanza organica nel terreno.**

Inta è particolarmente adatto in terreni asciutti e a basso pH dove permette produzioni abbondanti.

Il foraggio Inta ha proprietà organolettiche ben bilanciate ed è ricco in proteine.

**Inta is a late crimson clover variety. This allows Inta stands to be grazed until late spring.**

**Inta is particularly suitable for cereal rotation. It greatly improves the organic matter content in the soil.**

*Inta is highly suitable for dry and low pH soils, where it allows high yield.*

*Inta forage has well balanced organoleptic properties and is rich in protein content.*

### Caratteristiche morfo-fisiologiche *Morpho-physiological traits*

Taglia: medio-alta  
Contenuto proteico: molto alto  
Precocità: tardiva  
*Size: medium-high*  
*Protein: very high*  
*Time of flowering: late*

### Caratteristiche agronomiche *Agronomic features*

Resistenza al freddo: elevata  
Resistenza alle malattie: buona  
Produttività: elevata  
Utilizzo: pascolo, fieno  
*Frost tolerance: high*  
*Disease resistance: good*  
*Productivity: high*  
*Usage: grazing, hay*

### Tecnica agronomica *Agronomic methods*

Epoca di semina: agosto, settembre  
Dose di semina: 30 kg/ha  
Profondità di semina: 10-15 mm  
*Sowing period: August, September*  
*Seeding rate: 30 kg/ha*  
*Depth of sowing: 10-15 mm*

Concimazione (kg/ha) / *Fertilization (kg/ha):*

	Fabbisogno annuo <i>Annual need</i>
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100
K <sub>2</sub> O	80

Raccolta: piena fioritura  
*Cropping: flowering stage*